

3.268 Hohentwiel

3.074 Hohentwiel

VORBEMERKUNG: Über 100 Jahre war der Hohentwiel eine württembergische Exklave. Mit seiner Lage im Hegau und seinen speziellen naturkundlichen Eigenschaften als Vulkanberg stellte er für württembergische Botaniker, Zoologen, Geologen etwas Besonderes dar. Entsprechend eifrig wurde am Hohentwiel geforscht. Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeiten erschienen daher auch vorwiegend in württembergischen Publikationsorganen, z.B. in den Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ. Erst mit dem Gesetz über die Beseitigung von Ex- und Enklaven v. 28.3.1968 wird der Hohentwiel mit Wirkung v. 1.1.1969 umgemeindet aus dem LK Tuttlingen (Reg.-Bez. Südwürttemberg-Hohenzollern) in den LK Konstanz (Reg.-Bez. Südbaden, nach der Gebietsreform 1973 Reg.-Bez. Freiburg). Die Singener Bevölkerung beging den 1.1.1969 mit einem großen Fest auf dem Hohentwiel.

- AHLES, W. (1880): Zuwachs der Vereins-Naturaliensammlung. B. Botanische Sammlung.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **36**: 12-14.
- AHLES, W. (von) (1882): Zuwachs-Verzeichnis der Vereins-Naturaliensammlung. B. Botanische Sammlung.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **38**: 18-19.
- AHLES, W. (von) (1883): Zuwachsverzeichnisse der Vereins-Naturaliensammlung. B. Botanische Sammlung.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **39**: 14-16.
- AHLES, W. (von) (1884): Zuwachs-Verzeichnis der Vereins-Naturaliensammlung. B. Botanische Sammlung.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **40**: 9-12.
- ANONYMUS (1879): Thierreich.- In: Beschreibung des Oberamts Tuttlingen. Hrsg. Königlich statistisch-topographisches Bureau. 74-84; Stuttgart (H. Lindemann).
- ANONYMUS (1879): Thierreich.- In: Hohentwiel. Beschreibung und Geschichte. Hrsg. Königlich statistisch-topographisches Bureau. 24-31; Stuttgart (Th. Knapp).
- ANONYMUS (1929): Bericht über die Naturschutztagung des Württembergischen Landesamts für Denkmalpflege vom 16.-18. Oktober 1928 in Stuttgart.- Veröff. staatl. Stelle Naturschutz württ. Landesamt Denkmalpflege, **5**: 109-121.
- ANONYMUS (1930): Das Natrolitvorkommen am Hohentwiel In: Mitteilungen.- Veröff. staatl. Stelle Naturschutz württ. Landesamt Denkmalpflege **6**: 70
- ANONYMUS (1937): Sommerausflug ins Bodenseegebiet am 4. Juli 1937 (des Oberschwäbischen Zweigvereins für vaterländische Naturkunde). Führung: Dr. Grünvogel, Friedrichshafen.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **93**: XLI-XLII.
- ANONYMUS (1941): Der Hohenstoffeln, der Hohentwiel und die Felsengärten bei Hessigheim unter Naturschutz.- Schwäb. Heimatbuch, **27**: 131.
- ANONYMUS (1955): Jahresbericht der Landesstelle für Naturschutz und Landschaftspflege in Württemberg-Hohenzollern für das Jahr 1953.- Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Würt. u. württ. Bezirksstellen Ludwigsburg u. Tübingen, **23**: 14-20.
- ANONYMUS (1992): Waldschutzgebiete.- Die Urwälder von morgen. In: Der Schwarzwald aktuell.- Der Schwarzwald, Jg. **1992** (3): 119.
- ANONYMUS (M.B.) (1930): Vom Hohentwiel und dem Vulkanismus in Schwaben.- Bl. Schwäb. Albver., **42** (2): 59-60.
- APPEL, O. (1889): Beiträge zur Flora Badens.- Mitt. bad. bot. Ver., **2** (Nr. 62): 93-96.
- APPEL, O. (1889): Caricologische Mitteilungen.- Mitt. bad. bot. Ver., **2** (Nr. 67 u. 68): 146-148.
- ASTOR, E. & H. ENGELKE (1988): Hegauer Kegelbergland. In: BLICKPUNKTE Baden-Württemberg. Meyers geographische Führer zu Naturschönheiten.- Hrsg. Geograph.-Kartograph. Inst. Meyer, 162-166; Mannheim.
- ATTINGER, E. (1967): Die Farne des Hohentwiel.- Mitt. naturforsch. Ges. Schaffhausen, **28** (1963/67): 11-19.
- BACMEISTER, W. (1925): Die beiden kleinsten Eulen (Zwergohreule und Sperlingskauz) und ihr Vorkommen in Württemberg. (Bericht über den Vortrag am 4. März 1925).- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **81**: XCVIII-XCIX.
- BALLES, L. (1925): I. Beitrag zur Kenntnis der Hymenopterenfauna Badens.- Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz, N.F., **1** (23/24): 437-461.

- BARTSCH, J. (1923): Beiträge zur Pflanzengeographie des Hegau und des nordwestlichen Bodenseegebietes.- Diss. Univ. Freiburg.
- BARTSCH, J. (1924): Zur Flora des badischen Jura und Bodenseegebietes.- Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz, N.F., **1** (12/13): 301-309.
- BARTSCH, J. (1925): Die Pflanzenwelt im Hegau und nordwestlichen Bodensee-Gebiet.- Schr. Ver. Gesch. Bodensees, Beih. **1**: 194 S.
- BAUR, K. (1967): Georg von Martens Abhandlung: "Über die württembergische Alp".- Bl. Schwäb. Albver., **73** (6): 176-177.
- BAUR, W. (1891): Alphabetisches Verzeichnis nebst Standortangabe der von Jack, Leiner und Stizenberger herausgegebenen 10 Centurien Kryptogamen Badens.- Mitt. bad. bot. Ver., **2** (Nr. 87-89): 301-326.
- BAUR, W. (1894): Die Laubmoose des Großherzogthum's Baden. I-IV.- Mitt. bad. bot. Ver., **3**: (Nr. 121/122) 187-202, (Nr. 123-126): 207-238, (Nr. 127/128): 239-255.
- BENDER, H. (1981): Goethe im Hegau.- Hegau (38): 150-152.
- BENZING, A.G. (1965): Die naturräumliche Gliederung des Hegaus.- Hegau, (19): 9-24.
- BERNER, H. (1958): Die Walter-Wiederhold-Stiftung.- Hegau, (6): 154-159.
- BERNER, H. (1959/1989): Heimatchronik.- Hegau (8): 248-263 (1959), (11/12): 178-217 (1961), (13): 116-149 (1962), (14): 353-373 (1962), (18): 409-461 (1964), (20): 392-434 (1965), (21/22): 273-310 (1966), (23/24): 293-332 (1967), (25): 298-346 (1968), (26): 301-347 (1969), (27/28): 503-562 (1970/71), (29/30): 361-426 (1972/73), (31): 266-344 (1974), (34): 253-342 (1977), (35): 288-370 (1978), (38): 222-291 (1981), (39): 220-290 (1982), (40): 287-355 (1983), (41/42): 341-408 (1984/85), (43/44): 311-385 (1986/87), (45): 347-424 (1988), (46): 327-428 (1989).
- BERNER, H. (1964): Hegau-Tagung in Radolfzell.- Hegau, (18): 129-130.
- BERNER, H. (1969): Singen - junge Stadt mit alter Geschichte.- Der Schwarzwald, Jg. **1969** (1): 9-12.
- BERTSCH, K. & F. BERTSCH (1935): Neue Gefäßpflanzen der württembergischen Flora.- Veröff. staatl. Stelle Naturschutz württ. Landesamt Denkmalpflege, **11**: 70-83.
- BERTSCH, K. & F. BERTSCH (1948): Flora von Württemberg und Hohenzollern.- (2. Aufl.), 485 S.; Stuttgart (Wiss. Verlagsgesellschaft).
- BERTSCH, K. (1907): Hügel- und Steppenpflanzen im oberschwäbischen Donautal.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **63**: 177-196.
- BERTSCH, K. (1911): Unsere sternhaarigen Fingerkräuter.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **67**: 372-392.
- BERTSCH, K. (1912): Studien aus der heimischen Flora.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **68**: 33-41.
- BERTSCH, K. (1914): Beiträge zur Kenntnis unserer Veilchen und Hieracien.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **70**: 189-216.
- BERTSCH, K. (1918): Pflanzengeographische Untersuchungen aus Oberschwaben.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **74**: 69-172.
- BERTSCH, K. (1932): Neue und verschollene Farn- und Blütenpflanzen der württembergischen Flora.- Veröff. staatl. Stelle Naturschutz württ. Landesamt Denkmalpflege, **8**: 101-108.
- BERTSCH, K. (1949): Beiträge zur Kenntnis unserer Flora.- Veröff. Württ. Landesstelle Naturschutz u. Landschaftspflege, **18**: 145-185.
- BERTSCH, K. (1950): Merkwürdige Farne aus dem Naturschutzgebiet am Hohentwiel.- Veröff. württ. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege, **19**: 71-87.
- BERTSCH, K. (1951): Kritische Pflanzen unserer Flora.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **106** (1950): 46-68.
- BLUM, V. (1983): Tannenhäher.- In: Die Vögel des Bodenseegebietes (Hrsg. Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Bodensee), 335-336; Stuttgart (DBV-LV Bad.-Württ.).
- BNL FREIBURG (1990): Pflegekonzeption zum Naturschutzgebiet Hohentwiel, bei den Akten
- BRANCO, W. (1894): Schwabens 125 Vulkan - Embryonen und deren tufferfüllte Ausbruchsröhren; das größte Maargebiet der Erde. Teil I.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **50**: 505-997.
- BRAUN-BLANQUET, J. & W. KOCH (1928): Beitrag zur Flora Südbadens.- Beitr. naturwiss. Erforschung Badens, (1) 5-8.

- BRAUN-BLANQUET, J. (1931): Die Trockenrasengesellschaften des Hegaus und ihre Genese. In: Der Hohentwiel. Eine naturwissenschaftliche Einzeluntersuchung.- Veröff. staatl. Stelle Naturschutz württ. Landesamt Denkmalpflege, **7**: 59-65.
- BRAUN-BLANQUET, J. (1931): Über die Trockenrasengesellschaften des Hegaus und ihre Genese. In: Pflanzensoziologisch-pflanzengeographische Studien in Südwestdeutschland.- Beitr. z. Naturdenkmalpflege, **14** (3): 230-242.
- BRAUN-BLANQUET, J., H. SCHWENKEL & A. FABER (1931): Pflanzensoziologische Aufnahmen vom Sept. 1930. In: Der Hohentwiel. Eine naturwissenschaftliche Einzeluntersuchung.- Veröff. staatl. Stelle Naturschutz württ. Landesamt Denkmalpflege, **7**: 65-85.
- BRAUN-BLANQUET, J., O. ELWERT, A. FABER, A. FUNK, D. GEYER, R. LOHRMANN, H. SCHWENKEL & R. TÜXEN (1931): Der Hohentwiel. Eine naturwissenschaftliche Einzeluntersuchung. Veröff. staatl. Stelle Naturschutz württ. Landesamt Denkmalpflege., **7**: 5-94.
- BRUNNER, E. (1958): Hohentwiel mit Singen, Reiseführer mit geschichtlichem Abriß.- 6. Auf., 52 S.; Singen (Weber).
- BRUNNER, F. (1882): Verzeichnis der wildwachsenden Phanerogamen und Gefäßkryptogamen des Thurgauischen Bezirks Diessenhofen, des Randens und des Höhgaus.- Mitt. thurg. Naturforsch. Ges., **5**: 11-61.
- BÜCKING, W. (1985): Waldschutzgebiete in Baden-Württemberg.- Zum aktuellen Stand der Ausweisung.- Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ., **59/60** (1984): 57-76.
- BÜCKING, W. (1990): 90 Jahre Waldschutzgebiete in Baden-Württemberg.- Mitt. Ver. Forstl. Standortskunde u. Forstpflanzenzüchtung, (35): 85-98.
- BÜCKING, W. (1992): Liste der Waldschutzgebiete in Baden-Württemberg.- Mitt. Ver. Forstl. Standortskunde u. Forstpflanzenzüchtung, (35): 85-98.
- CHRIST, H. (1873): Die Rosen der Schweiz mit Berücksichtigung der umliegenden Gebiete Mittel- und Süd-Europas. Ein monographischer Versuch.- 219 S.; Basel - Genf - Lyon (H. Georg).
- DEMUTH, C. (1992): Geranieae - Storchschnabelgewächse.- In: Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Hrsg. O. Sebald, S. Seybold u. G. Philippi), **4**: 168-191; Stuttgart (E. Ulmer).
- DESCHLER, V. (1879): Vögel. In: Hohentwiel, Beschreibung und Geschichte. Hrsg. Königlich statistisch-topographisches Bureau.- 25-30; Stuttgart (Th. Knapp).
- DETZEL, P. (1991): Ökofaunistische Analyse der Heuschreckenfauna Baden-Württembergs (Orthoptera).- Diss. Univ. Tübingen, 365 S.
- DEUTSCHER BUND FÜR VOGELSCHUTZ (DBV)(1990): Jahresbericht 1989 über das Naturschutzgebiet Hohentwiel.- 7 S.
- DIEFFENBACH, Ch. E. (1826): Zur Kenntnis der Flora der Kantone Schaffhausen und Thurgau, sowie eines Theils des angränzenden Alt-Schwabens.- Flora oder Botanische Zeitung, **30**: 465-480.
- DIETERICH, H., S. MÜLLER & G. SCHLENKER (1970): Urwald von morgen. Bannwaldgebiete der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg.- 174 S.; Stuttgart.
- DÖLL, J. Ch. (1862): Beiträge zur Pflanzenkunde, mit besonderer Berücksichtigung der Flora des Großherzogthums Baden.- Ver. Naturkde. Mannheim, Jber. **28**: 29-45.
- DÜLL, R. (1969/1976): Moosflora von Südwestdeutschland.- Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz, N.F., **10** (1): 39-138 (1969), (2): 301-329 (1970), (3): 509-542 (1972); N.F., **4** (3/4): 275-310 (1976).
- DÜLL, R. (1970): Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung südwestdeutscher Moose, insbesondere von *Schistostega pennata*.- Jh. Ges. Naturkde. Württ., **125**: 109-136.
- EBERLE, H. (1906): Eine Osterwanderung durch den Hegau.- Bl. Schwäb. Albver., **18** (7): 219-224.
- EBERT, G. (Hrsg.) (1991): Die Schmetterlinge Baden-Württembergs.- **1**: 437-443; **2**: 13-17, 18-19, 19-26, 27-32, 64-69, 101-106, 106-111, 129-136, 156-161, 174-179, 179-183, 189-195, 195-200, 258-264, 291-296, 366-371, 371-375, 422-428, 496-500, 505-508; Stuttgart (E. Ulmer).
- EHRENFELD, F. (1935): Die Landschnecken der Umgebung von Konstanz.- Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz, N.F., **3** (10/11): 146-153.
- EICHLER, J., R. GRADMANN & W. MEIGEN (1905/1927): Ergebnisse der pflanzengeographischen Durchforschung von Württemberg, Baden und Hohenzollern.- Hrsg. Ver. vaterl. Naturkde. Württ. u. Bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz, (I): 1-78 (1905), (II): 79-135 (1906), (III): 135-218 (1907), (VI): 317-388 (1914), (VII): 389-454 (1927); Stuttgart.
- ELWERT, O. (1929): Schutz den Orchideen!- Veröff. staatl. Stelle Naturschutz württ. Landesamt

- Denkmalpflege, **5**: 59-65.
- ELWERT, O. (1931): Die klimatischen Verhältnisse des Hegaus. In: Der Hohentwiel. Eine naturwissenschaftliche Einzeluntersuchung.- Veröff. staatl. Stelle Naturschutz württ. Landesamt Denkmalpflege, **7**: 18-27.
- ENGELHARDT, W. & W. WEISKIRCHNER (1961): Einführung zu den Exkursionen der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft zu den Vulkansloten der Schwäbischen Alb und in den Hegau während der 39. Jahrestagung in Tübingen vom 11.-17. Sept. 1961.- Dt. miner. Ges., **24**.
- ERB, L. (1935): Kohlensäureaustritte im Hegau.- Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz, N.F., **3** (13/14): 197-198.
- FABER, A. (1931): Beobachtungen über Orthopteren des Hohentwiel. In: Der Hohentwiel. Eine naturwissenschaftliche Einzeluntersuchung.- Veröff. staatl. Stelle Naturschutz württ. Landesamt Denkmalpflege, **7**: 88-91.
- FEUCHT, O. (1912): Württembergs Pflanzenwelt. 138 Vegetationsbilder nach der Natur mit einer pflanzengeographischen Einführung.- I-VIII, 1-79; Stuttgart (Strecker u. Schröder).
- FEUCHT, O. (1921): Schutzgebiete heimischer Natur in Württemberg.- Bl. Schwäb. Albver., **33** (11/12): 141-142.
- FEUCHT, O. (1922): Der Naturschutz in Württemberg. Aufgaben und Möglichkeiten.- 80 S.; Stuttgart (Strecker u. Schröder).
- FEUCHT, O. (1929): Der Hohentwiel in Gefahr!?- Monatsschrift Württemberg, **1929**.
- FEUCHT, O. (1959): Erlebter Naturschutz. Eine Rückschau aus Württemberg.- 80 S. + 49 Kunstdrucktafeln (Hrsg. Schwäb. Albver. e.V.); Stuttgart.
- FEUCHT, O. (1961): Der Stadtbub lernt das Land kennen.- Schwäb. Heimat, **12** (6): 210-217.
- FIDUS, (o.V.) (1929): Um den Hohentwiel.- Schwäb. Heimatbuch, **15**: 131-132.
- FINCKH, L. (1938): Der Schienerberg.- Der Schwarzwald - Monatsbl. Schwarzwaldver., **75**. Vereinsjahr (6): 87-88.
- FINCKH, L. (1969): Hohentwiel. Der unbekannte Hegau.- Der Schwarzwald, Jg. **1969**: 6-7.
- FIX, H. (1991): Besonderheiten der Pflanzenwelt des Hegaus.- Der Schwarzwald, Jg. **1991** (3): 108-109.
- FIX, H. (1991): Der Hegau - eine erdgeschichtliche Betrachtung.- Der Schwarzwald, Jg. **1991** (2): 54-57.
- FÖHR, (o.V.) (1883): Die Phonolithe des Hegaus mit besonderer Berücksichtigung ihrer chemischen Konstitution.- Diss. Univ. Würzburg.
- FRAAS, O. (1879): Die geognostischen Verhältnisse des Hohentwiel. In: Hohentwiel. Beschreibung und Geschichte. Hrsg. Königlich statistisch-topographisches Bureau.- 2-10; Stuttgart (Th. Knapp).
- FRAAS, O. (1892): Zuwachs-Verzeichnisse der Vereins-Naturaliensammlung. In: Rechenschaftsbericht für das Jahr 1890-1891.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **48**: VII-X.
- FREY, K. (1905): Der Präzeptor am Hohentwiel - Eine Erinnerung an den Hohentwiel vor 100 Jahren.- Bl. Schwäb. Albver., **17**: 55-68.
- FUNK, A. (1931): Über Schmetterlinge am Hohentwiel. In: Der Hohentwiel. Eine naturwissenschaftliche Einzeluntersuchung.- Veröff. staatl. Stelle Naturschutz württ. Landesamt Denkmalpflege, **7**: 92-94.
- FUNK, A. (1957): Der Hohentwiel. Eine naturwissenschaftliche Betrachtung.- Hrsg. Stadt Singen (Hohentwiel), 2. Aufl., 364-368; Konstanz (Thorbecke).
- FUNK, A. (1958): Ur- und frühgeschichtliche Ausgrabungen und Funde im Hegau 1957/58.- Hegau, (6): 191-192.
- GACK, C. & A. KOBEL-LAMPARSKI (1985): Bemerkenswerte Käferfunde aus dem Kaiserstuhlgebiet. Angaben zur Autökologie.- Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ., **59/60** (1984): 361-390.
- GATTER, W. (1969): Über Verbreitung, Ökologie und Siedlungsdichte des Berglaubsängers (*Phylloscopus bonelli*) in Baden-Württemberg.- Jh. Ges. Naturkde. Württ., **124**: 237-250.
- GAUSS, R. (1974): Zweiter Nachtrag zur Hautflüglerfauna im badischen Raum.- Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz, N.F., **11** (2): 197-201.
- GEIGER, E. & A. SCHREINER (1958): Naturkundliche Exkursion zum Thurgauer Seerücken und Schiener Berg am 18. Mai 1958.- Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz, N.F., **7** (3/4): 263-266.
- GERSTENBERGER, P. (1978): Zur Unterscheidung von *Fragaria viridis* Duchesne und *Fragaria vesca*

- L. im vegetativen Zustand.- Gött. flor. Rundbriefe, **12**: 93-97.
- GEYER, D. (1894): Über die Verbreitung der Mollusken in Württemberg.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **50**: 66-141.
- GEYER, D. (1931): Die Schnecken am Hohentwiel. In: Der Hohentwiel. Eine naturwissenschaftliche Einzeluntersuchung.- Veröff. staatl. Stelle Naturschutz württ. Landesamt Denkmalpflege, **7**: 85-87.
- GLADITSCH, S. (1978): Weitere für Südwestdeutschland neue oder bemerkenswerte Käferarten. 11. Beitrag zur Faunistik der südwestdeutschen Coleopteren.- Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl., **37**: 149-158.
- GMELIN, C.Ch. (1805-1826): Flora Badensis, Alsatica et confinium regionum cis et transrhenana, plantas phanerogamas a lacu Bodamico usque ad confluentem Mosellae et Rheni sponte nascentes exhibens, secundum systema sexuale cum iconibus ad naturam delineatis.- **1**: 768 S. (1805); **2**: 717 S. (1806); **3**: 796 S. (1808); **4**: 808 S. (1826); Karlsruhe (A. Müller).
- GOHL, W. (1910): Eine Osterwanderung ins Hegau.- Bl. Schwäb. Albver., **22** (1): 20-22.
- GOTTSCHLICH, G. (1985): Die Haupt- und Zwischenarten der Gattung Hieracium L. (Compositae) in Südwest-Deutschland.- Jh. Ges. Naturkde. Württ., **140**: 151-182.
- GOTTSCHLICH, G. (1989): Anmerkungen zu Fundmeldungen von Hieracium racemosum Waldst. & Kit. ex Willd. aus dem außeralpinen Mitteleuropa.- Hess. Flor. Briefe, **38** (3): 36-44.
- GRADMANN, R. (1904): Allgemeiner Teil. Das Land. In: Königreich Württemberg.- Hrsg. K. Statistisches Landesamt, **1**: 10-58; Stuttgart (Kohlhammer).
- GRADMANN, R. (1905): Oberamt Tuttlingen (Geographischer Abschnitt). In: Das Königreich Württemberg.- Hrsg. K. Statistisches Landesamt, **2**: 590-598; Stuttgart (Kohlhammer).
- GREMMINGER, A. (1952): Nachtrag zum Verzeichnis der Großschmetterlinge aus der Umgebung von Graben-Neudorf (Oberrhein. Tiefebene).- Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl., **11**: 116-121.
- GROSSMANN, A. (1989): Die Pflanzenwelt des Belchengebietes im Südschwarzwald. In: Der Belchen - Geschichtlich-naturkundliche Monographie des schönsten Schwarzwaldberges.- Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ., **13**: 617-745; Karlsruhe.
- GRÜNVOGEL, E. (1957): Die erdgeschichtliche Entstehung der Bodenseelandschaft.- Schwäb. Heimat, **8** (2): 55-62.
- HÄCKER, O. (1904/1906): Die schönsten Aussichtspunkte der Schwäbischen Alb.- Bl. Schwäb. Albver., **16** (9): 303-310, (10): 359-362, (12): 431-436 (1904); **17** (1): 7-11, (2): 41-52, (3): 89-94, (9): 297-306, (10): 343-350, (11): 391-394, (12): 409-415 (1905); **18** (3): 83-87, (4): 123-132, (5): 161-168, (7): 217-220, (12): 369-378 (1906).
- HARDE, K.W. & R. KÖSTLIN (1962): Beiträge zur württembergischen Käferfauna.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **117**: 299-313.
- HARTMANN, F. (1924): Beiträge zu Badens Käferfauna.- Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz, N.F., **1** (12/13): 274-284.
- HARTMANN, F. (1926): Beiträge zu Badens Käferfauna III.- Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz, N.F., **2**: 41-56.
- HEGELMAIER, F. (1873): Über die Moosvegetation des schwäbischen Jura.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **29**: 145-254.
- HEILIGMANN, W. (1970): Die Scarabaeidae Südwestdeutschlands, Teil I. In: Beiträge zur Insekten-Faunistik Südwestdeutschlands.- Mitt. ent. Ver. Stuttgart, **5** (Sonderh. 5): 1-23.
- HEILIGMANN, W. (1971): Die Scarabaeidae Südwestdeutschlands, Teil II. In: Beiträge zur Insekten-Faunistik Südwestdeutschlands.- Mitt. ent. Ver. Stuttgart **6** (Sonderh. 7): 1-26.
- HELLER, M. (1988): Zum Vorkommen des Steinadlers (*Aquila chrysaetos* L.) im Schwarzwald unter besonderer Berücksichtigung des Feldberggebietes.- Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ., **63**: 271-280.
- HENN, K. (1968): Pflanzenwelt. In: Der Landkreis Konstanz.- Amtl. Kreisbeschreibung. Hrsg. Staatl. Archivverw. Bad.-Württ., **I**: 191-220; Konstanz.
- HEROLD, J. (1907): Die Verbreitung des Weinbaus in Württemberg.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **63**: 279-335.
- HERTER, L. (1887): Beiträge zur Moosflora Württembergs.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **43**: 176-220.
- HOCHSTETTER, G. (1913): König Wilhelm I. auf dem Hohentwiel.- Bl. Schwäb. Albver., **25** (1): 26-27.
- HÖFLE, M.A. (1850): Die Flora der Bodenseegegend mit vergleichender Betrachtung der

- Nachbarfloren.- 175 S.; Erlangen (F. Enke).
- HOFMANN, F. (1961): Das moderne geologische Bild des Hegau-Vulkanismus.- Hegau, (10): 301-313.
- HOFMANN, F. (1965): Hegauvulkanismus und Alpenfaltung.- Hegau, (20): 203-211.
- HOLZ, (o.V.) (1935): Der Querweg Freiburg-Bodensee im Arbeitsgebiet der Ortsgruppe Singen (Hohentwiel).- Der Schwarzwald - Monatsbl. Schwarzwaldver., **72**. Vereinsjahr, (6): 123-125.
- HÖLZINGER, J. (1987): Artenhilfsprogramm: Schwarzstirnwürger-Lanius minor (GMELIN, 1788).- In: Die Vögel Baden-Württembergs. Ed. J. Hölzinger, **1.2**: 1186-1190; Stuttgart (E. Ulmer).
- HÖLZINGER, J. (1987): Begründung, Aufgaben, Wege und Möglichkeiten des Vogel- und Naturschutzes.- In: Die Vögel Baden-Württembergs. Ed. J. Hölzinger, **1.1**: 23-28; Stuttgart (E. Ulmer).
- HORION, A. (1954): Beiträge zur Käfer-Fauna des Feldberggebietes. 2. Weitere montane und subalpine Arten.- Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz, N.F., **6** (2): 92-109.
- HORION, A. (1954/1955): Beitrag zur Käfer-Fauna des badischen Bodenseegebietes.- Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl., **13**: 51-61, (1954) **14**: 51-61 (1955).
- HORION, A. (1959/1961): Bemerkungen zur Faunistik der württembergischen Käfer.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **114**: 176-190 (1959), **116**: 238-265 (1961).
- ILN SINGEN (1998-2000): Untersuchungen zu den Auswirkungen des Hohentwielfestes auf Flora und Fauna (Stadt Singen/Lkr. Konstanz), 3 Zwischenberichte, Singen
- ISLER-HUEBSCHER, K. (1981): Beiträge 1976 zu Georg Kummers "Flora des Kantons Schaffhausen mit Berücksichtigung der Grenzgebiete".- Mitt. naturforsch. Ges. Schaffhausen, **31**: 7-121.
- JACK, J.B. (1892): Botanische Wanderungen am Bodensee und im Hegau.- Mitt. bad. bot. Ver., **2** (Nr. 96/97): 381-396.
- JACK, J.B. (1892): Botanischer Ausflug ins obere Donautal.- Mitt. bad. bot. Ver., **3** (Nr. 102): 13-24.
- JACK, J.B. (1893): Anhang zu "Botanische Wanderungen am Bodensee und im Hegau".- Mitt. bad. bot. Ver., **3** (Nr. 103): 28.
- JACK, J.B. (1900): Flora des badischen Kreises Konstanz.- 132 S.; Karlsruhe (J.J. Reiff).
- JACK, J.B. (1900): Zu den Lebermoosstudien in Baden.- Mitt. bad. bot. Ver., **4** (Nr. 169/170): 157-169.
- JACOBY, H., G. KNÖTZSCH & S. SCHUSTER (1970): Die Vögel des Bodenseegebietes.- Orn. Beob., Beih. z. Bd. **67**, 260 S.
- JACOBY, H., S. SCHUSTER & G. ZINK (1968): Die Vogelwelt des Kreises Konstanz. In: Der Landkreis Konstanz.- Amtl. Kreisbeschreibung. Hrsg. Staatl. Archivverw. Bad.-Württ., **I**: 221-247; Konstanz.
- JÜRGENS, K. & G. REHDING (1992): Xerothermophile Heuschrecken (Saltatoria) im Hegau.- Bestandssituation von *Oedipoda germanica* und *Calliptamus italicus*.- *Articulata*, **7**: 19-38.
- KÄGI, H. (1946): "Eine Reise nach dem Hohentwiel". In: Das Bodenseebuch.- Zürich.
- KARRER, F. (1879): Flora des Hohentwiel und Umgebung.- In: Hohentwiel, Beschreibung und Geschichte. Hrsg. Königlich statistisch-topographisches Bureau.- 10-24; Stuttgart (Th. Knapp).
- KARRER, F. (1881): Vergleichende Untersuchungen über die Flora der vulkanischen Hegauberge.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **37**: 127-140.
- KARRER, F. (1882): Über das Aufblühen der Gewächse in verschiedenen Gegenden Württembergs.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **38**: 263-283.
- KARRER, F. (1882): Flora des Hohentwiel mit Umgebung - in: Fraas, O.P. et al. Hohentwiel Beschreibung und Geschichte, S. 10-24, Stuttgart
- KELLER, K. (1970): Die Nolidae, Arctiidae und Endrosidae von Württemberg und angrenzenden Gebieten. In: Beiträge zur Insekten-Faunistik Südwestdeutschlands.- Mitt. ent. Ver. Stuttgart, **5** (Sonderh. 4): 1-34.
- KERSTING, G. und JEHLE, P. (1990): Pflegekonzeption Naturschutzgebiet „Hohentwiel“, 122 S.; BNL Freiburg.
- KIECHLE, J. (2001): Bedeutung der offenen Phonolith-Schutthalde des Hohentwiel für die Erhaltung besonders schutzbedürftiger Arten, Kurzgutachten, 2 Seiten, in den Akten der BNL Freiburg.
- KIRCHHEIMER, F. (1959): Die Radioaktivität der Phonolithe des Hegaus und das Vorkommen der Uran-Opale.- Hegau, (8): 207-218.
- KIRCHNER, O. & J. EICHLER (1900): Exkursionsflora für Württemberg und Hohenzollern.- I - XXX, 440 S.; Stuttgart (E. Ulmer).
- KIRCHNER, O. (1880): Beiträge zur Algenflora von Württemberg.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ.,

- 36**: 155-203.
- KNEUCKER, A. (1889): Fragmentarische Beiträge zur wissenschaftlichen Bedeutung teratologischer Vorkommnisse bei *Carex* mit besonderer Rücksicht auf *Carex praecox* Jacq.- Mitt. bad. bot. Ver., **2** (Nr. 66): 123-130.
- KNEUCKER, A. (1903): Pfingstexkursion 1903.- Mitt. bad. bot. Ver., **4** (Nr. 187/188): 316-317.
- KNEUCKER, A. (1921): Einige lichenologische, bryologische und andere Beobachtungen.- Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz, N.F., **1** (7): 191-195.
- KNICKENBERG, F. (1890): Die Nordgrenze des ehemaligen Rheingletschers.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **46**: 109-124.
- KNÖTZSCH, G. (1983): Kleiber.- In: Die Vögel des Bodenseegebietes (Hrsg. Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Bodensee), 321-322; Stuttgart (DBV-LV Bad.-Württ.).
- KOCH, K.A. (1920): OG. (Ortsgruppe) Tuttlingen: Wanderbericht 1919. In: Vereinsnachrichten.- Beil. z. Bl. Schwäb. Albver., **32** (1): 2-3.
- KOCH, W. & G. KUMMER (1929): Beitrag zur Hieracienflora Südbadens.- Beitr. naturwiss. Erforschung Badens, (2/3): 33-42.
- KOENIG-WARTHAUSEN, R. von (1889): Naturwissenschaftlicher Jahresbericht 1887.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **45**: 139-216.
- KÖNIGLICH STATISTISCH-TOPOGRAPHISCHES BUREAU (Hrsg.) (1879): Hohentwiel, Beschreibung und Geschichte.- 100 S.; Stuttgart (Th. Knapp).
- KOSTENBADER, H.U. (1969): Die Coccinelliden Südwestdeutschlands. In: Beiträge zur Insekten-Faunistik Südwestdeutschlands.- Mitt. ent. Ver. Stuttgart, **4** (Sonderh. 1): 1-27.
- KÖSTLIN, R. & H. VOGT (1971): Beitrag zur Mordellidenfauna.- Mitt. ent. Ver. Stuttgart, **6**: 35-74.
- KÖSTLIN, R. (1958): Weitere bemerkenswerte Käferfunde in Württemberg (4. Mitteilung).- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **113**: 324-327.
- KÖSTLIN, R. (1973): Die Gattung *Apion*. Mit einem Anhang über *Apion*-Funde außerhalb des eigentlichen Beobachtungsgebietes, soweit sie kontrolliert werden konnten. In: Beiträge zur Insekten-Faunistik Südwestdeutschlands.- Mitt. ent. Ver. Stuttgart, **8** (Sonderh. 12): I-III, 1-198.
- KRAUSE, W. (1978): Gezielte Bodenentblößung und Anlage frischer Wasserflächen als Mittel der Bestandserneuerung in Naturschutzgebieten.- Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ., **11**: 247-250.
- KRAUSS, E. (1935): Der Querweg Freiburg-Bodensee.- Der Schwarzwald, Monatsbl. Schwarzwaldver., **72**. Vereinsjahr (6): 112-114.
- KRAUSS, F. (1873): Zuwachs der Vereins-Naturaliensammlung vom 24. Juni 1871 bis dahin 1872. A. Zoologische Sammlung.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **29**: 7-11.
- KRAUSS, F. (von) (1882): Zuwachs der Vereins-Naturaliensammlung. A. Zoologische Sammlung.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **38**: 9-17.
- KREH, W. & G. SCHAFF (1931): Neue Glieder der Stuttgarter Pflanzenwelt II.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **87**: 131-146.
- KREH, W. (1952): Von der Veränderung des Landschaftsbildes durch neueinwandernde Pflanzen.- Veröff. württ. Landesstellen Naturschutz Landschaftspflege in Ludwigsburg und Tübingen, **21**: 68-71.
- KRIMMEL, O. (1888): Über das Vorkommen der Kreuzotter (*Pelias berus* MERE.) in Württemberg.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **44**: 232-239.
- KUHK, R. (1953): Vorkommen des Mauerläufers (*Tichodroma muraria*) in Baden-Württemberg.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **108**: 139-140.
- KUHK, R. (1970): Von der Vogelwelt des Hegaus. In: Der Hegau, Landschaft zwischen Rhein, Donau und Bodensee.- **3**: 120-128.
- KUMMER, G. (1937-1946): Die Flora des Kantons Schaffhausen mit Berücksichtigung der Grenzgebiete.- Mitt. naturforsch. Ges. Schaffhausen **13**: 49-157 (1937); **15**: 37-201 (1939); **17**: 123-260 (1941); **18**: 11-110 (1943); **19**: 1-130 (1944); **20**: 69-208 (1945); **21**: 75-194 (1946).
- LAGERHEIM, G. (1889): Revision der im Exsiccata "Kryptogamen Badens von Jack, Leimer und Stizenberger" enthaltenen Chytridiaceen, Peronosporaceen, Ustilagineen und Uredineen.- Mitt. bad. bot. Ver., **2** (Nr. 59): 69-76.
- LAIS, R. (1931): Beiträge zur Kenntnis der badischen Molluskenfauna III.- Beitr. naturwiss. Erforschung Badens, (7): 105-111.

- LANDESANSTALT F. UMWELTSCHUTZ MÜLLER, Th. (1966): Vegetationskundliche Beobachtungen im Naturschutzgebiet Hohentwiel, Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ., 34: 14 - 61; Ludwigsburg
- LANG, G. (1973): Die Vegetation des westlichen Bodenseegebietes.- Pflanzensoziologie **17**, 451 S.; Jena (G. Fischer).
- LEDERER, H. (1927): Über Radium- und Thoriumgehalt der vulkanischen Gesteine des Hegaus.- Ber. naturforsch. Ges. Freiburg, **27**: 144-163.
- LEININGER, H. (1951): Über Bienen, Grab-, Weg-, Faltenwespen und Ameisen aus dem Badischen Oberrheingebiet.- Beitr. naturkd. Forsch. Süd.-Dtl., **10**: 113-136.
- LEYDIG, F. (1871): Beiträge und Bemerkungen zur württembergischen Fauna mit teilweisem Hinblick auf andere deutsche Gegenden.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **27**: 199-271.
- LINCK, O. (1956): Steinbruch und Aufschluß in doppelter Sicht des Naturschutzes.- Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. u. württ. Bezirksstellen Stuttgart u. Tübingen, **24**: 265-287.
- LITZELMANN, E. & M. LITZELMAN (1963): Neue Pflanzenfundberichte aus Südbaden II.- Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz, N.F., **8** (3): 463-475.
- LÖHRL, H. (1935): Vogelbeobachtungen in württembergischen Naturschutzgebieten.- Veröff. staatl. Stelle Naturschutz württ. Landesamt Denkmalpflege, **11**: 84-102.
- LÖHRL, H. (1937): Zur Verbreitung des Berglaubsängers *Phylloscopus bonelli* (Vieillet) in Württemberg.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **93**: 103-115.
- LOHRMANN, R. (1925): Der Hohentwiel, württembergisches Naturschutzgebiet.- Aus der Heimat, **38**: 45.
- LOHRMANN, R. (1931): Die menschlichen Einwirkungen auf die Pflanzenwelt des Hohentwiels im Laufe der Geschichte. In: Der Hohentwiel. Eine naturwissenschaftliche Einzeluntersuchung.- Veröff. staatl. Stelle Naturschutz württ. Landesamt Denkmalpflege, **7**: 35-48.
- LOHRMANN, R. (1932): Zur Geschichte des Weinbaus am Hohentwiel.- Tuttlinger Heimatblätter, **15**: 10-12.
- LOHRMANN, R. (1943): Hohentwiel. In: Die Waldschutzgebiete der württembergischen Landesforstverwaltung.- Naturschutz, **24**: 38-43.
- LOHRMANN, R. (1958): Hans Schwenkel * 3. März 1886, + 15. Juli 1957.- Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. u. württ. Bezirksstellen Stuttgart u. Tübingen, **26**: 226-230.
- LOHRMANN, R. (1966): Aus der Frühzeit des Naturschutzgebietes Hohentwiel.- Natur u. Mensch, **8**: 248-249.
- LOHRMANN, R. (1969): Aus der Geschichte des Naturschutzes am Hohentwiel.- Naturschutz Oberschwaben-Bodensee-Hegau, **10**: 10-15.
- LUDWIG, W. (1970): *Alyssum murale* W. et K. (= *A. argenteum* hort. et auct. mult. non All.) in Gärten und als verwildernde Zierpflanze.- Hessische Floristische Briefe, **19**: 55-60.
- MANUEL, (o.V.) von (1805): Mineralogische Beschreibung der Gegend bei Hohentwiel im Hegau.- Denkschr. Vaterl. Ges. Aerzte u. Naturf. Schwabens **1**: 266-292; Tübingen (Geschrieben im November 1799).
- MARTENS, G. von & C. A. KEMMLER (1882): Flora von Württemberg und Hohenzollern.- I. Teil 296 S., II. Teil 412 S., 3. Aufl.; Heilbronn (Gebr. Henninger).
- MARTENS, G. von (1823): Über Württembergs Flora.- Corr.-Bl. württ. landwirtsch. Ver., **3**: 227-254.
- MARTENS, G. von (1857): Geschichte von Hohentwiel.- VIII, 267 S.; Stuttgart.
- MARTENS, G. von (1857): Zuwachs an Naturalien der Vereinssammlung. VIII. Pflanzen. In: Rechenschaftsbericht für das Jahr 1855/56.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **13**: 6-8.
- MAUS, R. (1982): Naturschutz - gestern - heute.- Hegau, (39): 155-160.
- MÄUSSNEST, O. (1970/71): Erdmagnetische Messungen im Hegauvulkangebiet.- Hegau, (27/28): 335-338.
- MAYER, A. (1913): Orchideenstandorte in Württemberg und Hohenzollern.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **69**: 357-401.
- MAYER, A. (1950): Exkursionsflora von Südwürttemberg und Hohenzollern mit besonderer Berücksichtigung der Universitätsstadt Tübingen.- LXXII, 527 S. (3. Aufl.); Stuttgart (Wiss. Verlagsgesellschaft).
- MAYER, G. (1982): Die botanischen Reisen und Exkursionen Carl Christian Gmelins.- Mitt. bad.

- Landesver. Naturkunde u. Naturschutz, N.F. **13** (1): 13-31.
- MAYER, K. (1929): Ein Festtag auf dem Hohentwiel.- Bl. Schwäb. Albver., **41** (5): 149-150.
- MEESS, A. (1907): Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Hemipteren-Fauna Badens.- Mitt. bad. zool. Ver., **2** (18): 130-151.
- MEICHLE, A. (1989): Ausverkauf der Natur am Hohentwiel? In: Der Schwarzwald aktuell.- Der Schwarzwald, Jg. **1989** (2): 76.
- MEIGEN, W. (1902): Gegenwärtiger Stand unserer pflanzengeographischen Durchforschung Badens.- Mitt. bad. bot. Ver., **4** (Nr. 179/180): 249-264.
- MEYER, G. (1935): Erdmagnetische Untersuchungen im Hegau.- Ber. naturforsch. Ges. Freiburg, **34** (2): 359-397 + 5 Karten.
- MITREITER, R. (1983): Blaumeise.- In: Die Vögel des Bodenseegebietes (Hrsg. Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Bodensee), 317-319; Stuttgart (DBV-LV Bad.-Württ.).
- MÖNIG, J. (1892): Zur Molluskenfauna im Oberamt Saulgau.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **48**: 119-134.
- MÜLLER, K. (1899): Übersicht der badischen Lebermoose.- Mitt. bad. bot. Ver., **4** (Nr. 160-162): 81-103.
- MÜLLER, Th. (1966): Vegetationskundliche Beobachtungen im Naturschutzgebiet Hohentwiel.- Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ., **34**: 14-61.
- MÜLLER, Th. (1968): Das Naturschutzgebiet Hohentwiel.- Naturschutz und Bildung, 226-237; auch: Die Schulwarte, **21** (5/6): 400-411.
- NEBEL, M. (1990): Ranunculaceae - Hahnenfußgewächse.- In: Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Hrsg. O. Sebald, S. Seybold u. G. Philippi), **1**: 235-322; Stuttgart (E. Ulmer).
- NEUMANN, R. (1905): Übersicht der Badischen Orchidaceen.- Mitt. bad. bot. Ver., **5** (Nr. 201-204): 1-26; Freiburg.
- NEUMANN, R. (1906): Beiträge zur Kenntnis der Badischen Orchidaceen.- Mitt. bad. bot. Ver., **5** (Nr. 208/209): 53-62.
- NIKUSCH, J. (1991): Parnassius apollo LINNAEUS 1758 - Apollofalter; Parnassius mnemosyne LINNAEUS, 1758 - Schwarzer Appollofalter.- In: Die Schmetterlinge Baden-Württemberg (Hrsg. G. Ebert) **1**: 195-207, 208-212; Stuttgart (E. Ulmer).
- OBERDORFER, E. (1927): Cotoneaster integerrima MED. am Feldberg im Schwarzwald.- Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz, N.F., **2** (9/10): 125-126.
- OBERDORFER, E. (1934): Die Felsspaltenflora des südlichen Schwarzwaldes. Neufunde von den Kaiserwachteln (Höllental).- Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz, N.F., **3** (1/2): 1-14.
- ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT BODENSEE (Hrsg.) (1983): Allgemeiner Teil.- In: Die Vögel des Bodenseegebietes, 9-52; Stuttgart (DBV-LV Bad.-Württ.).
- PAULUS, E. (1879): Beschreibung und Geschichte. In: Hohentwiel.- 31-47; Stuttgart (Th. Knapp).
- PFAENDLER, U. (1983): Gartengrasmücke - Mönchsgrasmücke.- In: Die Vögel des Bodenseegebietes (Hrsg. Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Bodensee), 295-297, 297-298; Stuttgart (DBV-LV Bad.-Württ.).
- PFEIFFER, W. (1936): Die Vulkanlandschaft des Hegaus.- Schwäb. Heimatbuch, **22**: 55-61; auch: Jb. 1936 Württ. Bundes-Heimatschutz.
- PHILIPPI, G. (1990/1992): Aspleniaceae - Streifenfarngewächse; Polypodiaceae - Zifelfarngewächse; Onagraceae - Nachtkerzengewächse; Apiaceae (Umbelliferae) - Doldengewächse.- In: Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Hrsg. S. Sebald, S. Seybold u. G. Philippi), **1**: 161-182, 184-187 (1990); **4**: 41-63, 246-334 (1992); Stuttgart (E. Ulmer).
- POEVERLEIN, H. & K. BERTSCH (1927): Beiträge zur Pilzflora von Württemberg. III. Rostpilze (Uredineen).- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **83**: 159-197.
- PROBST, J. (1887): Zur Kenntnis der in Oberschwaben wild wachsenden Rosen.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **43**: 142-175.
- QUINGER, B. (1990): Polygonaceae - Knöterichgewächse; Hypericaceae - Hartheugewächse; Cistaceae - Zistrosengewächse; Salicaceae - Weidengewächse.- In: Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Hrsg. O. Sebald, S. Seybold u. G. Philippi), **1**: 514-576; **2**: 8-23, 102-110,

- 117-170; Stuttgart (E. Ulmer).
- REBHOLZ, E. (1922): Beiträge zur Wildrosenflora des oberen Donautales und seiner Umgebung I.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **78**: 20-34.
- REBHOLZ, E. (1926): Die Pflanzenwelt der Fridinger Alb mit Berücksichtigung ihres Schutzgebietes.- Veröff. staatl. Stelle Naturschutz württ. Landesamt Denkmalpflege, **3**: 42-110.
- RECK, W. & W.O. DIETRICH (1922): Ein Beitrag zur Altersfrage der Hegau-Basalt-Vulkane.- Zbl. Mineral., Geol. Paläont., 139-148.
- RECK, W. (1923): Die Hegauvulkane.- 248 S.; Berlin (Gebr. Borntraeger).
- REISS, H. (1966): *Zygaena (Zygaena) osterodensis* REISS in Deutschland und in den angrenzenden Gebieten (Lep. Zygaenidae).- Mitt. ent. Ver. Stuttgart, **1** (2): 48-55.
- RICHTER, W. (1950/1951): Zur Verbreitung der Orthopteren in Südwestdeutschland.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **102-105**: 68-69 (1950), **106**: 149-152 (1951).
- RIEBER, X. (1891): Beiträge zur Kenntnis der Lichenenflora Württembergs und Hohenzollern.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **47**: 246-270.
- RIEPL, M. (1965): Geschichtsträchtiger Hohentwiel. In: Verliebt in den Bodensee.- 20-22; Stuttgart.
- ROESLER, C.A. (1839): Flora von Tuttlingen und seiner Umgebung bis Hohentwiel, Ludwigshafen und Werrenwag, beobachtet in den Sommern 1833 bis 1838. In: Tuttlingen. Beschreibung und Geschichte dieser Stadt.- 107-130; Tuttlingen.
- ROTH VON SCHRECKENSTEIN, F., J.M. VON ENGELBERG & J.N. RENN (1804-1814): Flora der Gegend um den Ursprung der Donau und des Neckars, dann vom Einfluß der Schussen in den Bodensee bis zum Einfluß der Kinzig in den Rhein.- **1**: 389 S. (1804); **2**: 645 S. (1805); **3**: 536 S. (1807); **4**: 567 S. (1814); Donaueschingen (A. Willibald).
- RUDY, H. (1926): Die Mauereidechse *Lacerta muralis* Laur.- Badische Naturdenkmäler in Wort und Bild Nr. 2.
- SCHÄFER, W. (1972): Die Geometriden von Württemberg und angrenzenden Gebieten. II. In: Beiträge zur Insekten-Faunistik Südwestdeutschlands.- Mitt. ent. Ver. Stuttgart, **7** (Sonderh. 11): 1-45 (136-180).
- SCHATZ, J.A. (1895): Das Fürstlich Fürstenbergische Herbar in Donaueschingen. Pfarrer J.B. Amtsbühler und Decan Fd. Brunner.- Mitt. bad. bot. Ver., **3** (Nr. 129): 259-265.
- SCHAUDT, B. & S. SCHUSTER (1938): Amsel.- In: Die Vögel des Bodenseegebietes (Hrsg. Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Bodensee), 274-275; Stuttgart (DBV-LV Bad.-Württ.).
- SCHEERER, F. (1968): Die Lochen - Eine namenkundliche Betrachtung.- Bl. Schwäb. Albver., **74** (1): 10-11.
- SCHEIFELE, M. (1969): Seit siebzig Jahren Waldschutzgebiete.- Staatsanzeiger f. Baden-Württ., **50** v. 25.6.1969, S. 5.
- SCHEUERLE, J. (1887): Botanische Funde und Fundorte.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **43**: 221-228.
- SCHLATTERER, A. (1887): Die Epilobien in Döll's Herbar.- Mitt. bot. Ver. Krs. Freiburg u. Land Baden, **1** (Nr. 44): 383-385.
- SCHLATTERER, A. (1912): Vorläufige Zusammenstellung der bisher gemeldeten Naturdenkmäler Badens.- Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz, **6** (Nr. 272-275): 165-194.
- SCHMID, G. (1965): Bemerkenswerte Käfer und Wanzen aus Baden-Württemberg.- Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ., **33**: 248-257.
- SCHMID, G. (1967): Wanzen aus Baden-Württemberg.- Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ., **35**: 89-107.
- SCHMID, J. (1925): Exkursion zum Hohentwiel und Bodensee am 5. u. 6. Juni 1925. Führung: Herr Geh.Rat Dr. Oltmanns.- Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz, N.F., **1** (20/21): 419-420.
- SCHMID-EGGER, Ch. & H. WOLF (1992): Die Wegwespen Baden-Württembergs (Hymenoptera, Pompilidae).- Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ., **67** (1991): 267-370.
- SCHMIDLE, W. (1913): Der Hohentwiel.- Schr. Ver. Gesch. Bodensee, **42**: 71-79.
- SCHMIDLE, W. (1930): Die Hegauvulkane von Singen bis Engen.- Bad. Heimat, **17**: 17-33.
- SCHMIDLE, W. (1949): Die Geologie von Singen und der Hegau-Vulkane.- 3. Aufl., 32 S., 2 Karten; Singen/Hohentwiel.
- SCHMIDT, K. & Ch. SCHMID-EGGER (1991): Faunistik und Ökologie der solitären Faltenwespen (Eumenidae) Baden-Württembergs.- Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ., **66**

- (1990): 495-541.
- SCHMIDT, K. (1979): Materialien zur Aufstellung einer Roten Liste der Sphecidae (Grabwespen) Baden-Württembergs. I. Philanthinae und Nyssoninae.- Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ., **49/50**: 271-369.
- SCHMIDT, K. (1981): Materialien zur Aufstellung einer Roten Liste der Sphecidae (Grabwespen) Baden-Württembergs. III. Oxybelini, Larrinae (außer Trypoxylon), Astatinae, Sphecinae und Ampulicinae.- Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ., **53/54**: 155-234.
- SCHMIDT, K. (1984): Materialien zur Aufstellung einer Roten Liste der Sphecidae (Grabwespen) Baden-Württembergs. IV. Pemphredoninae und Trypoxylonini.- Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ., **57/58** (1983): 219-304.
- SCHNEIDER, C. (1936): Lepidopterologische Beobachtungen 1936.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **92**: 154-155.
- SCHNEIDER, C. (1936/1939): Die Lepidopterenfauna von Württemberg. Makrolepidoptera. Großschmetterlinge.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **92**: 181-208 (1936), **93**: 123-160 (1937), **94**: 187-228 (1936), **95**: 231-287 (1939); Stuttgart.
- SCHOENICHEN, W. (1935/1937): Urdeutschland.- Deutschlands Naturschutzgebiete in Wort und Bild.- **1**: 319 S. + 107 Bildtafeln (1935); **2**: 342 S. + 106 Bildtafeln (1937); Neudamm (Neumann).
- SCHOENICHEN, W. (1952): Auf Viktor von Scheffels Pfaden. (Hohentwiel und seine Vegetation).- Unser Wald, **5**, (1): 9-10.
- SCHOENICHEN, W. (1956): Erinnerungsblätter aus der Geschichte des deutschen Naturschutzes.- Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. u. württ. Bezirksstellen Stuttgart u. Tübingen, **24**: 13-36 (Festschrift Hans Schwenkel).
- SCHÖNNAMSGRUBER, H. (1964): Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Südwürttemberg-Hohenzollern. Tätigkeitsbericht für die Jahre 1962 und 1963.- Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ., **32**: 181-187.
- SCHÖNNAMSGRUBER, H. (1967): Württembergische Banngebiete.- Schwäb. Heimat, **18** (4): 210-225.
- SCHÖNNAMSGRUBER, H. (1971): Richard Lohrmann (Nachruf).- Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ., **39**: 181-183.
- SCHREINER, A. (1961): Goethes geologische Bemerkungen bei seiner Reise durch den Hegau.- Hegau, (11/12): 104-107.
- SCHREINER, A. (1961): Graupensandrinne, Juranagelfluh und Deckentuff im Hegau.- Ber. naturforsch. Ges. Freiburg, **51** (2): 245-260.
- SCHREINER, A. (1968): Eiszeitliche Rinnen und Becken und deren Füllung im Hegau und westlichen Bodenseegebiet.- Jh. geol. Landesamt Baden-Württ., **10**: 79-104.
- SCHRÖDER, O. (1922): Für Süd-Baden neue oder bemerkenswerte Großschmetterlinge.- Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz, N.F., **1** (10): 251-255.
- SCHÜBLER, G. & G. von MARTENS (1834): Flora von Württemberg.- 695 S.; Tübingen (Osiander).
- SCHUMANN, (o.V.) (1905): Tuttlingen - Hohentwiel (Ortsbeschreibung).- In: Das Königreich Württemberg (Hrsg. K. Statistisches Landesamt), **2**: 615-617; Stuttgart (Kohlhammer).
- SCHUSTER VON FORSTNER, W. (1920): Weitere Veränderungen im Bestand der Albvogelwelt.- Bl. Schwäb. Albver., **32** (6/8): 71-74.
- SCHUSTER, S. (1983): Berglaubsänger - Zilpzap.- In: Die Vögel des Bodenseegebietes (Hrsg. Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Bodensee), 298-300, 301-302; Stuttgart (DBV-LV Bad.-Württ.).
- SCHWAB, G. (1847): Hohentwiel und das Hegäu. In: Das malerische und romantische Deutschland.- Schwaben, **I**: 190-200.
- SCHWENKEL, H. (1925): Warum brauchen wir Banngebiete? (aus Staatsanz. Beil. 1925 Nr. 1).- Bl. Schwäb. Albver., **37** (5): 72-74.
- SCHWENKEL, H. (1927): Der Naturschutz in Württemberg bis 1925.- Veröff. staatl. Stelle Naturschutz württ. Landesamt Denkmalpflege, **2**: 5-71 (2. Aufl.).
- SCHWENKEL, H. (1931): Der geologische Aufbau und die Landschaftsformen des Hohentwiels. In: Der Hohentwiel. Eine naturwissenschaftliche Einzeluntersuchung.- Veröff. staatl. Stelle Naturschutz württ. Landesamt Denkmalpflege, **7**: 10-17.

- SCHWENKEL, H. (1931): Der Plan der naturgeschichtlichen Erforschung des Hohentwiels. In: Der Hohentwiel. Eine naturwissenschaftliche Einzeluntersuchung.- Veröff. staatl. Stelle Naturschutz württ. Landesamt Denkmalpflege, **7**: 5-9.
- SCHWENKEL, H. (1931): Die wichtigsten geschichtlichen Ereignisse und ihre Rückwirkung auf die Natur. In: Der Hohentwiel. Eine naturwissenschaftliche Einzeluntersuchung.- Veröff. staatl. Stelle Naturschutz württ. Landesamt Denkmalpflege, **7**: 27-34.
- SCHWENKEL, H. (1931): Der Hohentwiel. eine naturwissenschaftliche Einzeluntersuchung, Anhang der Jh. Ver. vaterl. Naturkunde Württ., **86**: 4-94; Stuttgart
- SCHWENKEL, H. (1934): Der Hohentwiel als Hegauberg. In: Geschichte vom Hohentwiel-Hohentwiel im Krieg und Frieden.- Ein Führer durch die Festungsrüinen.- 12. Aufl., 6-9; Singen.
- SCHWENKEL, H. (1934): Die württembergischen Naturschutzgebiete (Vortrag am 22. Oktober 1934).- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **90**: LXXVIII-LXXXI.
- SCHWENKEL, H. (1934): Etwas von der Pflanzen- und Tierwelt des Hohentwiels und dem Banngebiet. In: Geschichte vom Hohentwiel-Hohentwiel im Krieg und Frieden.- Ein Führer durch die Festungsrüinen.- 12. Aufl., 9-15; Singen.
- SCHWENKEL, H. (1935): Die württembergischen Naturschutzgebiete.- Veröff. staatl. Stelle Naturschutz württ. Landesamt Denkmalpflege, **11**: 5-36.
- SCHWENKEL, H. (1935): Vorwort des Herausgebers.- Veröff. staatl. Stelle Naturschutz württ. Landesamt Denkmalpflege, **11**: 3-4.
- SCHWENKEL, H. (1940): Die Lage des Naturschutzes in Württemberg.- Veröff. württ. Landesstelle Naturschutz, **16**: 49-62.
- SCHWENKEL, H. (1949): Die in den Jahren 1941-1943 in Württemberg eingetragenen Naturschutzgebiete.- Veröff. württ. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege, **18**: 48-112.
- SCHWENKEL, H. (1950): Die württembergischen Naturschutzgebiete.- Schwäb. Heimat, **1** (1): 22-32.
- SCHWENKEL, H. (1952): Naturschutz und Landschaftspflege in Württemberg.- Schwäb. Heimat, **3** (3): 146-151.
- SCHWENKEL, H. (1953): Die Entstehung der Hegau-Vulkane.- Schwäb. Heimat, **4** (1): 26-29.
- SCHWENKEL, H. (1953): Die württembergischen Naturschutzgebiete und ihre Bedeutung für die Wissenschaft.- Veröff. württ. Landesstellen Naturschutz u. Landschaftspflege Ludwigsburg u. Tübingen, **22**: 27-44.
- SCHWOERBEL, J. (1959): Segelfalter auf dem Hohentwiel. In: Naturwissenschaftliche Dokumentation.- Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz, N.F., **7** (5): 408.
- SEBALD, O. & S. SEYBOLD (1969): Beiträge zur Floristik von Südwestdeutschland I.- Jh. Ges. Naturkde. Württ., **124**: 222-236.
- SEBALD, O. & S. SEYBOLD (1978): Beiträge zur Floristik von Südwestdeutschland V.- Jh. Ges. Naturkde. Württ., **133**: 125-132.
- SEBALD, O. & S. SEYBOLD (1981): Exkursion zum Irndorfer Hardt und zum Hohentwiel (13.7.1980).- Ber. Bot. Zirkel (BBZ) Stuttgart, (1): 7-10.
- SEBALD, O. & S. SEYBOLD (1982): Beiträge zur Floristik von Südwestdeutschland VII.- Jh. Ges. Naturkde. Württ., **137**: 99-116.
- SEBALD, O. (1990/1992): Brassicaceae (Cruciferae) - Kreuzblütler; Rosaceae - Rosengewächse (Potentilla L. 1753 - Fingerkräuter); Crassulaceae - Dickblattgewächse; Saxifragaceae - Steinbruchgewächse; Grossulariaceae - Stachelbeergewächse.- In: Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Hrsg. O. Sebald, S. Seybold u. G. Philippi), **2**: 170-342 (1990); **3**: 110-152, 226-253, 254-279, 281-288 (1992); Stuttgart (E. Ulmer).
- SEITZ, E. (1983): Grauschnäpper - Pirol.- In: Die Vögel des Bodenseegebietes (Hrsg. Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Bodensee), 307-308, 326-327; Stuttgart (DBV-LV Bad.-Württ.).
- SENF, E. (1976): Die Odonaten - Fauna des westlichen Bodenseegebietes.- Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz, N.F., **11** (3/4): 327-335.
- SETTELE, L. (1972): Fünfzig Jahre Sammelergebnisse zum Aufbau einer Schmetterlings-Sammlung von Europa 1919-1971.- Mitt. ent. Ver. Stuttgart, **7** (2): 61-76.
- SEUBERT, M. & K. PRANTL (1885): Exkursionsflora für das Großherzogtum Baden.- 420 S. (4. Aufl.); Stuttgart (E. Ulmer).
- SEUBERT, M. & L. KLEIN (1905): Exkursionsflora für das Großherzogtum Baden.- 454 S. (6. Aufl.); Stuttgart (E. Ulmer).

- SEYBOLD, S. & Th. MÜLLER (1972): Beitrag zur Kenntnis der Schwarznessel (*Ballota nigra* agg.) und ihre Vergesellschaftung.- Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ., **40**: 51-126.
- SEYBOLD, S. (1990/1992): Caryophyllaceae - Nelkengewächse; Chenopodiaceae - Gänsefußgewächse; Rosaceae - Rosengewächse; Fabaceae (Papilionaceae) - Schmetterlingsblütler (*Medicago* L. 1753 - Schneckenklee).- In: Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Hrsg. O. Sebald, S. Seybold u. G. Philippi), **1**: 368-466, 476-510 (1990); **3**: 193-226, 400-405 (1992); Stuttgart (E. Ulmer).
- STADT SINGEN (Hohentwiel) (Hrsg.) (1957): Hohentwiel.- 2. Aufl., 400 S.; Konstanz (Thorbecke).
- STEHLE, J. (1973): Geschichte der Exklave Bruderhof und der Hohentwieler Waldungen.- Bd. II, 468 S., 12 Bildtafeln, Beitr. z. Singener Geschichte. Hrsg. Stadtarchiv Singen (Hohentwiel) in Verbindung mit dem Verein f. Gesch. des Hegaus e.V., Hegau Bibliothek, Bd. 26.
- STEMMLER, K. (1914): Aus dem Großherzogtum Baden.- Orn. Beob., **11**: 184.
- STEUDEL, W. & E. HOFMANN (1882): Verzeichnis württembergischer Kleinschmetterlinge.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **38**: 143-262.
- STOFFLER, H.-D. (1959): Über Struktur und Ökologie der natürlichen Waldgesellschaften des Hegau unter besonderer Berücksichtigung der Bodentypen auf Phonolith und Basalt.- Dipl. Arb. Univ. Freiburg, 111 S.
- STOFFLER, H.-D. (1961): Die natürlichen Waldgesellschaften des Hegaus.- Hegau, **6** (11/12): 92-103.
- STOFFLER, H.-D. (1967): Über die wichtigsten natürlichen Waldgesellschaften des Hegaus, dargestellt am Beispiel der Umgebung Singens und Engens.- Hegau, **12** (23/24): 161-194.
- TIMMERMANN, G. (1992): Rosaceae - Rosengewächse (*Rosa* L. 1753 - Wildrose).- In: Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Hrsg. O. Sebald, S. Seybold u. G. Philippi), **3**: 64-101; Stuttgart (E. Ulmer).
- VERHOEFF, K.W. (1936): Unsere Kenntnisse von den Diplopoden des alemannischen Gaus.- Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl., **1**: 228-254.
- VERHOEFF, K.W. (1937): Die Isopoden des alemannischen Gaus und ihre geographisch-ökologische Beurteilung.- Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl., **2**: 22-39.
- VOGGESBERGER, M. (1992): Fabaceae (Papilionaceae) - Schmetterlingsblütler.- In: Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Hrsg. O. Sebald, S. Seybold u. G. Philippi), **3**: 288-333, 387-400, 405-450; Stuttgart (E. Ulmer).
- VOIGT, K. (1970): Neue Wanzenfunde aus Baden.- Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl., **29** (2): 147-150.
- VULPIUS, F.W. (1887): Der Höhgau und das badische Donauthal.- Mitt. bot. Ver. Krs. Freiburg u. Land Baden, **1** (Nr. 34/40): 299-301, 351-355, 368-372, (Nr. ?): 375-381.
- WAGENITZ, G. (1977): Zur Bestimmung der *Leucanthemum*-Arten in Mitteleuropa nördlich der Alpen.- Göttinger Flor. Rundbr., **10** (4): 80-85.
- WAIS, J. (1901): Auf zur Alb.- Bl. Schwäb. Albver., **13** (1): 9-16, (2): 59-64, (3): 99-103, (4): 171-174.
- WEINER, O. (1966): Die Bergschlösser und hohen Hübel. Reisebericht aus dem Hegau.- Hegau, **11** (21/22): 133-158.
- WEISS, P.H. (1971): Das Bannwaldgebiet Hohentwiel. Eine Studie zur Landschafts- und Vegetationsentwicklung.- Dipl.-Arb. Univ. Freiburg, 95 S.
- WERNER, E. (1904): Das Ries in der schwäbisch-fränkischen Alb.- Bl. Schwäb. Albver., **16** (5): 153-168.
- WERNER, H., St. WERNER, W. FIEDLER & E. KLEIN (1993): Jahresbericht 1992 über das Naturschutzgebiet Hohentwiel Gmkg. Singen/Kreis Konstanz. Hrsg. NABU Naturschutzbund Deutschland - Ortsgruppe Radolfzell-Singen-Stockach.- Naturschutzhaus Mettnau Mitt., (13): 15 S.
- WERNER, HERMANN (1926): Schützet den Apollo!- Veröff. staatl. Stelle Naturschutz, württ. Landesamt Denkmalpflege, **3**: 134-144.
- WERNER, St., H. WERNER & W. FIEDLER (1992): Jahresbericht 1991 über das Naturschutzgebiet Hohentwiel Gmkg. Singen/Kr. Konstanz (Hrsg. NABU Naturschutzbund Deutschland - Ortsgruppe Radolfzell-Singen-Stockach).- Naturschutzhaus Mettnau Mitt., (9): 11 S.
- WESTRICH, P. & K. SCHMIDT (1985): Für Baden-Württemberg neue und seltene Bienen und Wespen

- (Hymenoptera Aculeata).- carolina, **42**: 115-120.
- WESTRICH, P. (1982): Zur Verbreitung der Knopfhornblattwespen - Gattung Corynis in Baden-Württemberg (Hymenoptera, Cimbicidae). In: Wissenschaftliche Mitteilungen.- carolina, **40**: 102-103.
- WESTRICH, P. (1983): Die Bienen Baden-Württembergs. I. Megachilidae (Hymenoptera: Apoidea).- Stuttgarter Beitr. Naturk. Ser. A., **363**, 50 S.
- WESTRICH, P. (1989): Die Wildbienen Baden-Württembergs.- 2 Teile, 972 S. (S. 518, 656, 658, 661, 690, 691, 703, 739, 772, 804); Stuttgart (E. Ulmer).
- WIDENMANN, (o.V.) von (1894/1897): Alte schöne und interessante Bäume in Württemberg.- Bl. Schwäb. Albver., **6** (7): 141-145, (11): 227-228, (12): 246-247 (1894); **7** (4): 58-60, (8): 150, (10): 177-178 (1895); **8** (1): 13, (7): 237-238, (9): 311-314, (10): 333-334 (1896); **9** (1): 10-11, (3): 87-88 (1897).
- WILMANN, O. & S. RUPP (1966): Welche Faktoren bestimmen die Verbreitung alpiner Felsspaltenspflanzen auf der Schwäbischen Alb?- Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege, **34**: 62-86.
- WIRTH, V. (1969): Die Flechten des Südschwarzwaldes.- Beitr. naturkdl. Forsch. Südw.-Dtl., **28**: 19-31.
- WIRTH, V. (1974): Die Flechten des Südschwarzwaldes. III. Teil.- Beitr. naturkdl. Forsch. Südw.-Dtl., **33**: 81-101.
- WITSCH, M. (1986): Zur Ökologie, Verbreitung und Vergesellschaftung von *Daphne cneorum* L. in Baden-Württemberg, unter Berücksichtigung der zöologischen Verhältnisse in den anderen Teilarealen.- Jh. Ges. Naturkde. Württ., **141**: 157-200.
- WITSCH, M. (1991): Die *Trinia glauca* - reichen Trockenrasen in Deutschland und ihre Entwicklung seit 1880.- Ber. bayer. Bot. Ges., **62**: 189-219.
- WOLF, Th. (1908): Monographie der Gattung *Potentilla*.- Bibliotheca Botanica, **71**: 1-75.
- WÖRZ, A. (1949/1958): Die Lepidopterenfauna von Württemberg. II. Microlepidopteren. Kleinschmetterlinge.- Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., **97/101** (1949): 220-254, **102/105** (1950): 49-64, **106** (1951): 125-144; **107** (1952): 191-211, **108** (1953): 90-118, **109** (1954): 83-130, **110** (1955): 229-260, **111** (1956): 223-254, **112** (1957): 282-313, **113** (1958): 253-312.
- WÖRZ, ARNO (1992): Fabaceae (Papilionaceae) - Schmetterlingsblütler (*Vicia* L. 1753 - Wicke).- In: Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Hrsg. O. Sebold, S. Seybold u. G. Philippi), **3**: 333-362; Stuttgart (E. Ulmer).
- ZAHN, H. (1890/1895): Altes und Neues aus der badischen Flora.- Mitt. bad. bot. Ver., **2** (Nr. 76-79): 234-236 (1890), (Nr. 83): 268-270 (1891); **3** (Nr. 131/132): 279-289 (1895).